

la suture sur une longueur de 4 à 5 mill., mais sans jamais gagner sur le premier interstrie.

---

### Sur le genre *Phlæotherates* Bates [COL.]

par Maurice MAINDRON.

Dans le petit essai monographique que j'ai donné, dans nos *Annales* (1906, p. 197) du genre *Phlæotherates*, j'ai omis une espèce décrite en 1878 par Putzeys, le *P. procerus*. Remarquable par sa grande taille (13 mill.), par la largeur de ses épaules, il rentre dans ma division A contenant les formes à pronotum quadrangulaire, et est très voisin du *P. luctuosus* Maindr. Le *P. procerus* a été décrit dans les *Mittheil. München. ent. Ver.* [1878], p. 55, sur deux exemplaires ♂ ♀ récoltés par Steinheil dans les environs de Medellin (Nouvelle-Grenade) à 2.000 mètres d'altitude. La trop grande confiance que j'ai toujours eue dans les citations de Bates a été la cause de mon erreur. Cet auteur dit expressément, dans la *Biologiæ centr. amer.*, Col., I, p. 175, qu'il n'existe que trois espèces du genre décrites à ce jour (1884), les *P. guginus* Dej., *nigropiceus* Bates, et *quadricollis* Chaud.

Au premier abord, le *P. luctuosus* diffère du *procerus* par son pronotum à côtés non anguleux, par ses élytres plus larges, avec la série des fovéoles marginales obsolète, etc.

---

### Remarques synonymiques [COL.]

par Maurice MAINDRON.

*Amœbœa* Péringuey 1896 (*Lachnophorinae*). Préoccupé dès 1830 par Ehrenberg (Protozoaires). Je propose le nom de **Nothochalybe**, nom. nov.

*Rhathymus* Dej. 1831 (*Platysmatinae*). Nom préoccupé dès 1825 par Lepeletier pour un genre d'Hyménoptères. Je propose le nom de **Parastrigia**, nom. nov.

*Holconotus* Schm. Gœb. (*Abacetini*), nom. nudum in Faun. Birm., pl. n, fig. 6, 1846. C'est seulement en 1876 que Chaudoir (Monogr. Abacet.) donna la diagnose du genre, alors que Forster, quatorze ans

auparavant (1862) avait employé le même nom pour un genre d'Hyménoptères, et même Agassiz, en 1854, l'avait employé pour un genre de Poissons fossiles. Je propose le nom de **Fouquetius**, nom. nov.

*Vertagus* Dej. 1831 (*Chlaeniini*). Préoccupé dès 1753 par Klein (Mollusques gastéropodes). Je propose le nom de **Mecochlaenius**, nom. nov.

*Pselaphoxys* Tschit. 1897 (*Harpalinae*). Préoccupé par Raffray en 1890 pour un genre de Coléoptères psélaphiens. Je propose le nom de **Desbordesius**, nom. nov.

*Agriodus* Péring. 1896 (*Daptini*). Nom préoccupé en 1839 par H. Smith (Mammifères). Je propose le nom de **Nothodaptus**, nom. nov.

*Diaphorus* Dej. 1831 (*Zuphiini*). Dès 1824 Meigen avait employé ce nom pour un genre de Diptères. Il faudra donc rendre à ces *Carabidae* leur nom de *Pseudaplilus* donné par Castelnau en 1835 (*Étud. Entom.*, p. 56).

---

**Sur l'accouplement et les œufs**  
d'*Anisolabis mauritanica* H. Lucas [ORTH.]

par Henri GADEAU DE KERVILLE.

L'accouplement des Forficulidés n'avait jusqu'alors été décrit — du moins à ma connaissance — que chez *Forficula auricularia* L., *Chelidura aptera* Charp., *Chelidura pyrenaica* Géné et chez *Labidura riparia* Pall., dans une note inédite de M. E.-J.-B. Sopp, dont je publierai prochainement la traduction. Quant aux œufs, ils ne m'étaient connus, et seulement par description, que chez *Forficula auricularia* et *Chelidura pyrenaica*.

Au cours du voyage zoologique que j'ai fait au printemps dernier en Khroumirie, région montagnaise, humide et verdoyante de la Tunisie septentrionale, j'ai trouvé communément sous les pierres, dans la région d'Aïn-Draham, *Anisolabis mauritanica* H. Luc., et, au mois de mai, j'ai observé l'accouplement et les œufs de cet Orthoptère.

Pendant la copulation, le mâle et la femelle sont situés bout à bout, rectilignement ou formant un angle entre eux. Leurs pattes reposant sur le sol, il faut nécessairement que la partie postérieure de leur